

Kennistest bij Apotheeknascholing Bloeddrukverlagers

1. Bij meer dan de helft van de mensen wordt de oorzaak voor hoge bloeddruk niet gevonden.	Juist/Onjuist
2. Door hoge bloeddruk kunnen vaten beschadigen en hierdoor ontstaat aderverkalking.	Juist/Onjuist
3. Hoge bloeddruk is de belangrijkste risicofactor voor hart-en-vaatziekten.	Juist/Onjuist
4. Roken veroorzaakt aderverkalking.	Juist/Onjuist
5. Door af te vallen kan je de bloeddruk meer verlagen dan door te stoppen met roken.	Juist/Onjuist
6. Een normale bloeddruk is 60/100 mm Hg.	Juist/Onjuist
7. Bij hoge bloeddruk is zowel de onder- als bovendruk te hoog.	Juist/Onjuist
8. De Hartstichting adviseert: gemiddeld anderhalf uur per dag matig bewegen of een half uur intensief.	Juist/Onjuist
9. Meer dan 1 op de 3 patiënten stopt met zijn bloeddrukverlagers of gebruikt ze veel te onregelmatig.	Juist/Onjuist
10. Als de bloeddruk een jaar lang goed is, kan men de medicatie langzaam afbouwen. Meestal blijft hij dan laag.	Juist/Onjuist
11. Meestal is één medicijn voldoende om de bloeddruk te verlagen.	Juist/Onjuist
12. Furosemide wordt vooral bij hoge bloeddruk gebruikt.	Juist/Onjuist
13. Dikke enkels zijn een veelvoorkomende bijwerking van losartan.	Juist/Onjuist
14. Amlodipine veroorzaakt bij veel mensen kriebelhoest.	Juist/Onjuist